



Reiseimpfungen

Impfung gegen	Indikation/Reiseziel	Anwendung siehe Beipackzettel
Tetanus (A, R)	Jede Wunde, jede Bagatellverletzung Nach Grundimmunisierung alle 10 Jahre Auffrischimpfung.	Grundimmunisierung: 2 Injektionen im Abstand von 4 Wochen, die 3. Injektion nach 1 Jahr, dann alle 10 Jahre
Poliomyelitis (R, S)	Grundimmunisierung im Kindesalter Bei unvollständiger Grundimmunisierung Impfung mit IPV. Eine routinemäßige Auffrischung nach dem vollendeten 18. Lebensjahr wird nur nach besonderer Indikation empfohlen.	Ungeimpfte / unvollständig geimpfte Personen erhalten IPV entsprechend den Angaben des Herstellers
Diphtherie (A, R)	Nach Grundimmunisierung im Kindesalter alle 10 Jahre auffrischen, evtl. in Kombination mit Tetanusimpfung	Nichtgeimpfte oder Personen mit fehlendem Impfnachweis sollten im Abstand von 4 – 8 Wochen erhalten, 3. Impfung nach 6 – 12 Monaten.
Hepatitis A (R)	Bei mangelhaften Hygieneverhältnissen; Mittelmeerländer, tropische und subtropische Länder.	Eine Dosis am besten 2 – 4 Wochen vor Antritt der Reise, 2. Dosis je nach Hersteller nach 6 bzw. 6 – 12 Monaten. Auffrischung nach 5 – 10 Jahren, (evtl. auch als Kombinationsimpfstoff gegen Hepatitis A + B).
Hepatitis B (R)	Weltweite Verbreitung, insbes. tropische Länder, Sextourismus	Je 1 Dosis zum Zeitpunkt 0, 4 Wochen, 6 Monate (je nach Hersteller Abweichungen möglich)
Gelbfieber (R)	Mittel- und Südamerika, Afrika, Länder, in denen diese Krankheit vorkommt.	Lebendimpfung, spätestens 10 Tage vor Ausreise, in einem Gelbfieber- impfinstitut (siehe Merkblatt „Gelbfieberimpfstellen“) Auffrischungen sind alle 10 Jahre erforderlich, nur bei speziell autorisierten Impfstel- len möglich.

Typhus (R)	(Typhoral L oder Typhim Vi) Exponierte Personen in verschiedenen Gebieten Asiens, Afrikas, Südamerikas.	Lebendimpfstoff, 3 x 1 Dosis, mindestens 1 Woche vor Reisebeginn sollte die Impfung abgeschlossen sein. Auffrischimpfung wird im Abstand von 3 Jahren empfohlen.
Malaria (R)	Kein Impfstoff verfügbar, aber Medikamentöse Prophylaxe, notwendig in Afrika, Asien, Mittel- und Süd- Amerika.	Je nach Medikament auf Anweisung des behandelnden Arztes.
Frühsommer-Meningo-Enzephalitis (R, S)	Herde in Österreich, Südosteuropa, Süddeutschland (siehe spezielles Kartenmaterial).	Grundimmunisierung und Auffrischungen nach Angaben des Herstellers.
Meningokokken-Infektion (R, S)	Exponierte Personen in verschiedenen Gebieten Afrikas, Asiens, Brasiliens.	Meningokokken-Polysaccharide, Vaccine, Gruppe A und C, nach Empfehlung des Herstellers.

R = Reise-Impfung, von der WHO veröffentlichte Infektionsgebiete beachten!

RS = Reise-Impfung in Sonderfällen

A = Impfung für die Allgemeinheit empfohlen, besonders bei Reisen auch in Mittelmeerländer

Mit freundlicher Empfehlung

**Ihr Gesundheitsamt
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5
61352 Bad Homburg
Tel. : 06172/999-5800, -5870**